



Parasites ménagers – comment s'en débarrasser

Nom	Description	Habitat/Dégâts occasionnés	Moyens de lutte
Anthrènes des tapis	Jusqu'à 4,5 mm, larves brunes jusqu'à 6 mm.	Textiles, sacs de couchage, fourrures, tapis, matelas, moquettes.	Laver les tissus attaqués à 60 degrés et les suspendre au soleil. Ou les mettre pendant deux jours au congélateur. Mettre au soleil et taper. Huile de patchouli, lavande.
Attagènes des peaux	4-5 mm, larves jusqu'à 12 mm.	Fourrures, tapis, laine, animaux en peluche, couvertures, matelas, fauteuils, sacs de couchage.	Faire nettoyer chimiquement ce qui est contaminé ou mettre pendant trois jours au congélateur.
Blattes	Blatte allemande: 11–14 mm, jaune-argile-brun, œufs brun clair, 6–8 mm. Blatte commune: 23–28 mm, brun clair-brun foncé, œufs brun foncé-noir, 10–11 mm.	Odeur nauséabonde (glandes odorantes), morsures dans les réserves de nourriture, saletés, transmission de micro-organismes (des bactéries, des champignons, ainsi que des parasites animaux pathogènes et endommageant les aliments), allergies.	Lutte souvent dans toute la maison mais toujours dans toutes les zones contaminées, seulement par un professionnel de la lutte contre les parasites. Colmater les joints, ne pas laisser traîner des restes d'aliments, éliminer les déchets, mettre des appâts, laisser pendant 3 mois pour attraper aussi les larves.
Cloportes	Jusqu'à 12 mm. Sept paires de pattes régulières, corps aplati. Cloporte des caves gris, cloporte des murs noirâtre-brun, corps lisse pour le cloporte commun. Se replie sur lui en cas de danger.	Crottes, bois marqué par des champignons. Les réserves de pommes de terre et de fruits peuvent être endommagées par des morsures, sinon inoffensifs.	Moustiquaires. Eliminer les cachettes (colmater les trous et les fissures). Assécher les locaux en les chauffant et en les aérant. Dresser une barrière de poudre à lever aux ouvertures de portes. Appâter les cloportes avec des moitiés de pommes de terre ou de raves (plutôt blettes) ou disposer des pots de fleurs remplis de mousse ou de fibres de bois, ouverture appuyée contre le mur. Jeter les bestioles attrapées sur le compost.
Dermestes du grain	2-3 mm; brun foncé. Larves jaune-brun.	Produits céréaliers, malt, lait en poudre, cacahouètes, riz, thé, fines herbes, épices, légumineuses.	Jeter les aliments contaminés, les chauffer pendant une heure au four à 60 degrés, les laisser pendant 3 jours au congélateur. Bien passer l'aspirateur dans les placards à réserve (aussi fissures), essuyer, sécher.
Dermestes du lard	6-10 mm, poils clairs sur les ailes, brun-noir. Larves mesurant jusqu'à 15 mm, allongées et très poilues.	Farine de poisson, aliments pour animaux, plumes, fourrures, chocolat. Risque pour la santé à cause des poils des larves (allergies, maladies intestinales). Morsures sur les aliments. Trous dans les textiles.	Jeter ce qui a été attaqué, chauffer les produits attaqués une heure au four à 60 degrés ou arroser avec de l'eau bouillante. Faire nettoyer chimiquement les fourrures ou les laisser emballées pendant dix jours au congélateur.



Fourmis	2,5-4 mm, œufs 1 mm, larves blanchâtres et dépourvues de pattes.	Aucun risque pour la santé dans la maison. Elles sont attirées par le sucre, les fruits, le miel, les douceurs. Certaines espèces détruisent le bois ou les matériaux d'isolation.	Boucher tous les points d'entrée potentiels et les colmater (bande de glu, huile de paraffine). Fermer les routes empruntées par les fourmis: barrières de poudre de pierre, mélangée avec de l'huile essentielle de lavande ou d'aiguilles de pin. Bien nettoyer des tronçons du chemin ou l'interrompre avec de l'eau chaude. Utiliser éventuellement des pièges anti-fourmis.
Gibbium psylloides ou ptine bombé	2-3 mm. Nocturne, aime les vieux bâtiments, les cavités des plafonds et des sols.	Mange le cuir, les tentures-textile, les meubles rembourrés, les linges éponge, les peluches, les aliments de toutes sortes.	Mettre des linges humides le soir, le matin, tuer les gibbiums récoltés avec de l'eau bouillante ou jeter dans les toilettes. Sous le sol: professionnel de la lutte contre les parasites.
Mites	Envergure des ailes: 12-16 mm, jaune-blanche. Larves (chenilles) jaunâtres.	Textiles, fourrures, tapis, plumes. Pas de risque pour la santé.	Laver les tissus attaqués à 60 degrés et les suspendre au soleil. Ou les mettre pendant trois jours au congélateur. Huile de patchouli, lavande, camphre, bois de cèdre ou huile de margousier (neem). Contrôler régulièrement les vêtements stockés et les conserver au frais et au sec. Stocker dans des housses hermétiquement fermées.
Mouches	Œufs blanc-jaunâtre, allongés. Larves sous forme de petits asticots blanchâtres sans tête et sans pattes, jusqu'à 10 mm. Mouches adultes couleur pie, vert doré ou bleu foncé à noir.	Viande, produits carnés, poisson, fromage et substances organiques en décomposition. Ponte des œufs en tas, généralement cachés dans les creux des aliments. Les larves peuvent éclore peu après avoir été pondues et tout de suite pénétrer dans les aliments, la contamination passe donc souvent inaperçue. Dégâts: morsures, liquéfaction des produits, transmission d'agents pathogènes, moisissures aux aliments et bactéries, nuisances.	Ne pas laisser d'aliments traîner sans emballage. Pièges à mouches, moustiquaires. Vider et nettoyer souvent les poubelles et les bacs à compost. Les mouches fuient la lavande, la citronnelle et le basilic. Planter dans les plate-bandes et dans des bacs sur le balcon ou sur le bord des fenêtres.
Mouches du vinaigre	2-3 mm, parfois jusqu'à 6 mm. Larves sous forme d'asticots.	Se multiplie très vite. Pondent leurs œufs sur des aliments qui pourrissent ou fermentent. Les larves mangent des levures et des bactéries formées durant le processus de pourrissement. Peuvent transmettre des micro-organismes.	Jeter les aliments contaminés. Pièges à mouches avec de la purée de pommes ou un mélange de jus et de vinaigre de pommes additionné de produit vaisselle. Eviter de conserver les fruits et les boissons à l'air libre.



Niptus dorés	2,5-4,5 mm, ressemblent à des araignées. Nocturnes, apprécient les vieux bâtiments.	Cuir, meubles rembourrés, peluches, draps éponge, tentures-textile.	Déposer le soir des linges humides et tuer le matin les parasites qui s'y trouvent dans de l'eau bouillante. Jeter ce qui a été contaminé. Coléoptères sous le sol: faire appel à un spécialiste de la lutte contre les parasites.
Poissons d'argent	Jusqu'à 10, sans ailes, écailles argentées brillantes, 3 longs prolongements. Œufs: d'abord blancs puis bruns, ovales allongés, environ 1 mm. Larves: ressemblent aux animaux adultes mais en plus petit.	Dégâts aux papiers peints, aux reliures de livres, aux photos et aux tissus amidonnés en cas de forte invasion. Parfois aussi farine, sucre ou graines attaqués.	Garder votre appartement sec, beaucoup aérer, colmater les joints et les fissures. Utiliser comme appâts des linges humides, légèrement sucrés, ramasser les insectes le matin et les éliminer dans les toilettes. Verser ensuite de l'eau bouillante salée dans tous les écoulements et répéter cette opération plusieurs fois. Les araignées sont des ennemis naturels des poissons d'argent.
Puces	1,5-4 mm, larves jusqu'à 6 mm.	Sucent le sang. Les piqûres démangent longtemps et fortement, pustules. En Europe centrale, pas de transmission de maladie mais les piqûres peuvent facilement s'infecter.	Passer l'aspirateur 4 x par jour (7 jours). Produits anti-puces pour les animaux domestiques. Bien taper et aérer les tapis. Vaporiser une solution à base de sel de cuisine dans les joints, isoler avec du ruban adhésif (3 jours). Professionnel de la lutte contre les parasites.
Punaises de lit	1-7 mm, plates.	Sucent le sang, piquent essentiellement la nuit. Les piqûres démangent longtemps, forment des pustules. Les personnes allergiques réagissent souvent violemment. Ne transmettent pas de maladie dans nos contrées.	Taper les cadres de lit, jeter les punaises dans les toilettes. Coller du ruban adhésif double-face autour de tous les pieds du lit. Moustiquaires. Professionnel de la lutte contre les parasites.
Staphylins noirs	1-1,5 mm, larves jusqu'à 3 mm. Vit là où il y a des moisissures (murs humides).	Ne provoque pas de dégâts mais signale des moisissures. Se nourrit des moisissures.	Aérer régulièrement. Assécher les locaux humides, cela fait mourir les bêtes.
Teignes des fruits secs	Envergure des ailes: jusqu'à 22 mm, chenilles jusqu'à 20 mm. Ailes antérieures gris argenté à l'intérieur, avec une bande rouge bronze à l'extérieur.	Farine, pâtes, graines, céréales, amandes, noix, légumineuses, chocolat, aliments pour les animaux. Aliments fortement contaminés par les filaments et les crottes. Les larves peuvent passer des mois dans leur cocon puis les papillons apparaissent subitement.	Jeter les aliments contaminés. Nettoyer les armoires, passer soigneusement l'aspirateur (aussi dans les fentes). Pièges autocollants avec des phéromones. Stocker les aliments dans des récipients fermés hermétiquement.



Ténébrions meuniers	Jusqu'à 18 mm, larves (vers de farine) 20 mm. Vole le soir en été.	Alimentation pour les animaux, farines et produits céréaliers, cadavres d'acariens et autres produits animaux et végétaux. La farine devient grumeleuse et sent le renfermé.	Jeter les produits contaminés, les chauffer pendant une heure au four à 60 degrés ou les arroser d'eau bouillante. Jeter les ténébrions par la fenêtre, c'est une nourriture appréciée des oiseaux. Une lutte ne s'avère que très rarement nécessaire car les bêtes se remarquent facilement en raison de leur taille et ne se multiplient pas très rapidement.
Vrillettes	3-4 mm, larves (vers du bois) jusqu'à 6 mm, blanc-jaune.	Les larves mangent le bois humide ou les livres (indice: trous ronds de 2-3 mm de diamètre, poussière de bois).	Garder le logement au sec en aérant bien. Utiliser des produits contenant du borax et de l'acide borique pour les meubles. Demander conseil à un spécialiste.
Vrillettes du pain	2-3 mm, larves 5 mm.	Pâtes, pain croustillant, riz, épices, fines herbes, fleurs séchées, semences, aliments pour animaux, cuir.	Jeter les aliments contaminés, les chauffer pendant une heure au four à 60 degrés, les laisser pendant 8-10 heures au congélateur ou les arroser d'eau bouillante.